

# ยาที่ควรหลีกเลี่ยง ในสตรีให้นมบุตร



กลุ่มยา/รายการยาที่ควร  
หลีกเลี่ยงในสตรีให้นมบุตรตาม  
โครงการ RDU Hospital มีดังนี้

1. Ergots/ Ergotamine เนื่องจาก  
ทำให้ปริมาณน้ำนมลดลง และมีรายงานการเกิดอาการ  
ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง (ergotism) ในทารกที่ดูดนม  
มารดา
2. Amiodarone เนื่องจากยานี้ถูกขับออกทางน้ำนมใน  
ปริมาณมาก ประกอบกับยานี้มีไอโอดีนเป็น  
ส่วนประกอบ อาจทำให้ทารกเกิดภาวะ hypothyroidism  
หรือมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติได้
3. ยาเคมีบำบัด และยากดภูมิคุ้มกัน (โดยเฉพาะ  
cyclophosphamide, methotrexate และ  
mycophenolate) เนื่องจากยาเหล่านี้อาจกดระบบ  
ภูมิคุ้มกัน และกดไขกระดูกในทารก

## เอกสารอ้างอิง

1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล.คู่มือการ  
ดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย;2558.
2. ภาพจาก <http://www.med.cmu.ac.th>

## ความคงตัวหลังเปิดใช้ Kepra® oral solution



Kepra® ชื่อสามัญทางยา คือ levetiracetam  
รูปแบบยาสำหรับรับประทาน (100 mg/mL)  
ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการชักชนิด partial onset ที่มี  
หรือไม่มี secondary generalization  
บริษัท แกแล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด  
แจ้งข้อมูลความคงตัวหลังเปิดใช้ของยา levetiracetam  
oral solution 100 mg/mL (Kepra®) ดังนี้ หลังเปิดใช้  
ยานี้จะมีความคงตัว 7 เดือน เมื่อเก็บยาที่อุณหภูมิ  
25 องศาเซลเซียส

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 - 7007

สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964

สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9 - 9555



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ INFLUENZA VACCINE UPDATE
- ❖ ความคงตัวหลังการเจือจาง  
Neopam® (pralidoxime)
- ❖ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการ  
เตรียมสารน้ำที่ให้ทาง  
หลอดเลือดดำ
- ❖ ยาที่ควรหลีกเลี่ยง  
ในสตรีให้นมบุตร
- ❖ ความคงตัวหลังเปิดใช้ Kepra® oral  
solution

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4  
เดือนมกราคม 2560

# INFLUENZA VACCINE UPDATE

ข้อมูลองค์ประกอบของสายพันธุ์ของไวรัส  
ใช้หวัดใหญ่ที่นำมาทำเป็นวัคซีนปี 2016-2017  
Northern strain เป็นดังนี้ (ประกาศเมื่อ 25  
กุมภาพันธ์ 2559)

## สำหรับ Trivalent Flu vaccine :

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus;

B/Brisbane/60/2008-like virus.

## สำหรับ Quadrivalent Flu vaccine :

จะเพิ่มสายพันธุ์ของ Yamagata lineage อีก 1 สาย

พันธุ์คือ B/Phuket/3073/2013-like virus.

## เอกสารอ้างอิง

Recommended composition of influenza virus vaccines for  
use in the 2016-2017 northern hemisphere influenza  
season. Available at:

[http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2016\\_17\\_north/en/](http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2016_17_north/en/) Accessed on Dec 2, 2016.

# ความคงตัวหลังการเจือจาง

## Neopam® (pralidoxime)




Neopam® ชื่อสามัญทางยา คือ  
pralidoxime หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 2-PAM  
ขนาดบรรจุขวดละ 1 กรัม รูปแบบผงปราศจากเชื้อ  
สีขาวถึงเหลืองอ่อน ขอบ่งใช้คือ เป็นยาด้านพิษ  
ของยาฆ่าแมลงในกลุ่ม organophosphates

กลไกการออกฤทธิ์ ของยาคือทำให้เอนไซม์  
acetylcholinesterase ซึ่งไม่สามารถทำงานได้  
เนื่องจากถูก Organophosphates มายับยั้งไว้  
กลับมาทำงานได้อีกครั้ง ดังนั้นการให้ยาจึงต้องให้  
ทันท่วงทีและได้ในขนาดที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้  
เอนไซม์เสียไปอย่างถาวร

ข้อมูลจากบริษัท ภิญญโณฟาร์มาซี เรื่องความ  
คงตัวของยาภายหลังการเจือจางด้วย 0.9% NaCl ที่  
ความเข้มข้น 10 mg/mL พบว่า มีความคงตัว 24  
ชั่วโมง ที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

# คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ

## การเตรียมสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำ



บ่อยครั้งที่หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยาได้รับ  
คำถามจากพยาบาลประจำหอผู้ป่วย ช่วงนอกเวลา  
ราชการเกี่ยวกับการเตรียมสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำ  
ที่ไม่มีในโรงพยาบาล ดังนั้นจึงขอรวบรวมสรุปเป็นตาราง  
เพื่อสะดวกในการผสมเอง ดังนี้

สารน้ำที่ต้องการ เตรียม (ปริมาตร 1,000 mL)	ปริมาณที่ใช้ในการเตรียม (mL)		
	NSS	D50W	SWI
NSS/3	333.3	-	666.7
NSS/4	250	-	750
NSS/5	200	-	800
12.5%DS/2	500	250	250
12.5%DS/3	333.3	250	416.7
12.5%DS/4	250	250	500